



Graag contact met ons opnemen indien u niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak.

Praktische info

Eerste infusie op om..... uur op de

- Dageenheid geneeskunde (campus Bornem, route 150)
- Dageenheid campus Willebroek

U hoeft niet nuchter te zijn, tenzij uw arts dit gevraagd heeft. Tijdens de infusiebehandeling mag u de infuseeheid niet verlaten. Breng gerust iets mee om te lezen of te werken. U kan ook wat rusten en praten met de andere patiënten. Draag best comfortabele kledij. In normale omstandigheden kan u na de behandeling zelf naar huis rijden.

Contactgegevens

De dageenheid campus Bornem is te bereiken op 03 890 17 43, alle werkdagen van 08u00 tot 18u00.

De dageenheid campus Willebroek is te bereiken op 03 860 32 43, alle werkdagen van 07u00 tot 18u00.

Heeft u nog vragen, neem contact op met uw IBD verpleegkundig consulente

Veroniek Vandewalle, 03 890 59 27
Veroniek.Vandewalle@sjk.be

Dienst gastro (route 160)
Dageenheid Bornem (route 150)
Dageenheid Willebroek

Dienst IBD

(Inflammatory Bowel Disease)

Dr. P. Potvin
Dr. G. Van den Steen

Dienst reumatologie

Dr. B. Vander Cruyssen

IBD (inflammatoire darmziekten)
Reumatologie

Starten met Infliximab

(Remicade®, Inflectra®,
Remsima®)

Informatiebrochure



Wat is Infliximab (IFX)?

Infliximab is een geneesmiddel dat ontstekingen afremt en wordt voorgeschreven voor de behandeling van:

- Ziekte Van Crohn
- Colitis Ulcerosa
- Psoriasis
- Reumatoïde artritis
- Spondylitis Ankylosans
- Psoriatische artritis

Infliximab is een medicament dat behoort tot de groep TNF-alfablokkers. TNF-alfa is een eiwit dat een rol speelt bij het ontwikkelen en in stand houden van ontstekingen. Infliximab bindt zich aan dit eiwit en neutraliseert zo de biologische werking.

Opstarten en dosis

Voor de behandeling met Infliximab kan gestart worden wordt er eerst gescreend op actieve of inactieve tuberculose. Dit gebeurt met een röntgenfoto van de longen, een tuberculine huidtest en bloedafname.

Infliximab wordt toegediend via een infuus. De dosering wordt uitgerekend aan de hand van het lichaamsgewicht.

Voor elke toediening zal er een bloedafname gebeuren.

Bij het starten van de behandeling wordt het infuus toegediend op week 0, week 2, week 6 gedurende 2 u. Vanaf het 4^{de} infuus worden ze toegediend om de 6 of 8 weken (onderhoudsbehandeling) gedurende 1 uur indien goed verdragen.

Wat is het effect met deze behandeling?

Bij toediening voor IBD:

Tot 80% van de patiënten treedt er een duidelijke verbetering op van de klachten binnen de 3 tot 7 dagen na het geven van het infuus. Ongeveer 6 op 10 van de patiënten zijn zelfs volledig klachtenvrij nadien, met vaak een volledige genezing van het darmslijmvlies na enkele maanden. Dit is geen definitieve genezing omdat het medicament gemiddeld 8 weken werkt waarna de klachten kunnen terugkomen. Daarom wordt Infliximab steeds verdergezet indien er een goede respons is.

Bij toediening voor reumatologische klachten:

Tot 80% van de patiënten treedt er een duidelijke verbetering op van de klachten binnen de 3 tot 7 dagen na het geven van het infuus. Ongeveer 6 op 10 van de patiënten zijn zelfs volledig klachtenvrij nadien. Dit is geen definitieve genezing omdat het gemiddeld 8 weken werkt waarna de klachten kunnen terugkomen. Daarom wordt Infliximab steeds verder gezet indien er een goede respons is.

Mogelijke nevenwerkingen

Zeldzaam kunnen tijdens of onmiddellijk na het infuus volgende bijwerkingen optreden: hoofd- en spierpijn, duizeligheid en lage bloeddruk. **Verwittig onmiddellijk de verpleegkundige** wanneer u zich onwel begint te voelen tijdens de toediening.

Patiënten die behandeld worden met Infliximab hebben een licht verhoogde gevoeligheid voor infecties. Controleer uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt of andere tekenen van infectie (bv etterend wondje) vertoont.

Het gebruik van Infliximab kan leiden tot huiduitslag. Meestal gebeurt dit na meerdere behandelingen. De huiduitslag kan tijdens de toediening optreden, maar ook als u weer thuis bent. Meld deze reactie aan uw arts. Soms kunnen de allergische reacties behandeld worden met anti-allergiemiddelen. Zelden is het nodig de behandeling te stoppen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij een mogelijke zwangerschap(wens) dient u contact op te nemen met uw behandelende arts. Het al dan niet verderzetten van Infliximab tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt per patiënt individueel bekeken en besproken met de arts. Meestal (zo mogelijk) wordt Infliximab vermeden in het 3^e trimester van de zwangerschap.